

Behandling med Vipidia eller Vipdomet

Behandlingsstart

Hvis du starter med vipidia, vil du typisk starte med 25 mg dagligt.

Hvis du starter med vipdomet (kombinationstablet indeholdende metformin og vipidia), vil du typisk starte med 1000/12,5 mg morgen og aften.

Hvordan virker vipidia / vipdomet?

Vipidia / Vipdomet sænker dit blodsukker ved at øge nogle hormoner i blodet kaldet incretiner. Disse incretiner stimulerer din insulinproduktion og sænker hormonet kaldet glucagon, hvilket fører til at din eget insulin lettere får sukkeret fra blodet ud i musklerne, hvor det skal bruges. Dermed falder dit blodsukker.

Hvilke bivirkninger kan jeg få?

Der er sjældent bivirkninger ved dette præparat. Enkelte kan få kvalme, ondt i maven, luft i maven eller diarre.

Hvornår skal man være forsigtig med synjardy-behandling?

Nyrefunktion måler vi i noget, der hedder eGFR. Normale værdier ligger over 60. Ved nedsat nyrefunktion med eGFR under 50, vil vi nedsætte dosis til maksimalt 12,5 mg i døgnet. Vi holder øje med din nyrefunktion med de årlige blodprøver.

Kort om diabetes

Diabetes er bl.a. kendetegnet ved, at sukkerindholdet i dit blod er for højt. Dette kan medføre åreforkalkning, hvilket på sigt kan føre til blodpropper i hjertet eller hjernen, nedsat syn, nedsat nyrefunktion, dårlig blodomløb, etc. Det er ikke kun forhøjet blodsukker, der giver åreforkalkning. Forhøjet blodtryk, for højt kolesterol, rygning, overvægt og usund kost kan også medføre åreforkalkning. Det er derfor vigtigt at gøre noget ved alle disse faktorer ved diabetes, så du samlet kan nedsætte din risiko for at udvikle følgesygdommene. Vi vil tale med dig om disse forskellige emner ved diabetes-kontrollerne hos os. Alt efter hvor godt reguleret din diabetes ligger, vil vi se dig mellem 1-4 gange om året.